

ช่วงนี้ประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เตือน!! อย่าให้ยุ่งกั๊ด หากป่วยห้ามซื้อยากินเอง
และรีบไปพบแพทย์



ไข้เลือดออก

อันตรายหน้าฝน

มหันตภัยร้ายจากยุงลาย

ระยะแรก

มีไข้สูง อาจปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ มีผื่น บางคน อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน

ระยะวิกฤต

ระยะต้องระวังมากที่สุด
เพื่อยและซึม นี้ออกน้อย ปวดท้อง เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด หรือเป็นสีดำ ในระยะนี้ **ไข้จะลดลง มือเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้ช็อกจนเสียชีวิต**

ระยะฟื้นตัว

นี้ออกมากขึ้น อยากอาหารมากขึ้น ปวดท้อง หรือ ท้องอืดลดลง

ที่สำคัญ ! ควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อก หากมีไข้ต่อเนื่อง 3 วัน หรือมีอาการรุนแรงขึ้น ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน

ป้องกันไม่ให้ยุ่งกั๊ด ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์

สวมเสื้อผ้าปิดชิด สีส่อน

เพราะเสื้อผ้าสีเข้มดูดแสง และมีกลิ่นเหม็นยุงชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุงชอบ

ตารางสีที่ชอบ

แดง	ส้ม	เหลือง	เขียว	น้ำเงิน	ม่วง
ชมพู	ฟ้า	เทา	ดำ	ขาว	น้ำตาล

ทายากันยุง สเปรย์กันยุง

ใช้อุปกรณ์ไล่ยุง

เครื่องไล่ยุง ไม้ช้อนยุง สติ๊กเกอร์กันยุง

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

เก็บบ้าน

เก็บขยะ

เก็บน้ำ

FACEBOOK

WEBSITE

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ถนนระบือ-โคกสี ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
☎ 0 4421 2900 ต่อ 305 📠 0 4421 8018

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 66
☎ 1422
สำนักควบคุมโรค

ประชาสัมพันธ์

เตือนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำขัง ในภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นหากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ให้รีบพบแพทย์ หากมีอาการครั้งแรก ไม่หายต้องไปครั้งที่ 2 เพื่อตรวจให้ละเอียด

และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

สำหรับลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก คือ ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในระยะต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการเพลียและซึม เลือดกำเดาไหล หรืออุจจาระเป็นสีดำ ในระยะนี้ไข้จะลดลง มือเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ อาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ที่สำคัญควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อก และขอให้ประชาชนสังเกตอาการป่วยของคน ในครอบครัว หากมีไข้สูงลอย และเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 22 กรกฎาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 598 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 10-14 ปี 5-9 ปี และ 0-4 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในปกครอง

จึงขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดย ทายากันยุง นอนในมุ้ง อยู่ในที่โล่งแจ้งมีลมถ่ายเทได้สะดวก อย่าอยู่ในที่มอับ มีด และให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน ให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพัก เก็บภาชนะกักเก็บน้ำ ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
เก็บขยะ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการไข้สูงลอย รวมปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว และแขน ขา ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้